

TD 9
Transformée de Fourier

Dans ce TD, si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction intégrable, sa transformée de Fourier est définie par la formule

$$\hat{f} : \xi \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx.$$

Exercice 1 *Propriétés de la transformation de Fourier*

Soit $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions intégrables. On suppose (lorsque c'est nécessaire) que f est dérivable, et de dérivée intégrable. Soient a, b, ξ_0 trois réels. Compléter le tableau suivant :

Fonction	Transformée de Fourier
$x \mapsto af(x) + bg(x)$	
$x \mapsto f(ax)$	
$x \mapsto f(x + a)$	
$x \mapsto f(x)e^{ix\xi_0}$	
$x \mapsto (f * g)(x)$	
$x \mapsto f(x)g(x)$	
$x \mapsto f'(x)$	
$x \mapsto xf(x)$	

Exercice 2 *Premiers exemples de transformées de Fourier*

Calculer les transformées de Fourier des fonctions suivantes :

$$f = \mathbb{1}_{[a,b]} \quad \text{et} \quad g : x \mapsto \exp(-cx)\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x),$$

où les réels a, b et c vérifient $a < b$ et $c > 0$.

Exercice 3 *Transformée de Fourier d'une fonction radiale*

Soit $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ une fonction radiale, au sens où il existe une fonction mesurable g de \mathbb{R}_+ dans \mathbb{R} telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, \quad f(x) = g(|x|),$$

où $|x|$ désigne la norme euclidienne de x . Montrer que sa transformée de Fourier \hat{f} est également radiale.

Exercice 4 *Espace de Schwartz*

L'espace de Schwartz en dimension d est défini par

$$\mathcal{S} := \left\{ f \in C^\infty(\mathbb{R}^d), \forall k \in \mathbb{N}, \forall \alpha \text{ multi-indice}, |x|^k D_\alpha f(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0 \right\},$$

où $D_\alpha f$ désigne la dérivée partielle de f par rapport au multi-indice α . Montrer que l'espace de Schwartz est stable par la transformée de Fourier, au sens où

$$\hat{\mathcal{S}} := \{\hat{f}, f \in \mathcal{S}\} \subset \mathcal{S}.$$

Puis, montrer que $\hat{\mathcal{S}} = \mathcal{S}$.

Exercice 5 *Un calcul de transformée de Fourier par changement de variable* On cherche à déterminer la transformée de Fourier \hat{f} de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$, sans faire appel à la formule d'inversion.

- Après avoir justifié que \hat{f} est bien définie, prouver la formule suivante, pour ξ réel,

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*} e^{-i\xi \frac{x}{y}} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy,$$

puis se ramener à une intégrale en y .

- Montrer que pour $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable positive, et $c > 0$, on a toujours

$$\int_{\mathbb{R}} g\left(y - \frac{c}{y}\right) dy = \int_{\mathbb{R}} g(y) dy.$$

- Déterminer \hat{f} .